

相关的乳酸酸中毒，应立即停止的一般性支持治疗，建议立即

瓜相关的乳酸酸中毒，应立即开始治疗，同时立即停止服用本品。

怀疑乳酸酸中毒的患者，推荐
E酸中毒，排除蓄积的二甲双胍
最好时盐酸二甲双胍可以170
透析），经过这样的治疗通常症

于乳酸酸中毒症状的教育，如果
1. 停止服用本品并就医。

能存在的二甲双胍相关乳酸酸中毒的方法降低风险和进行管理：
二甲双胍相关的乳酸酸中毒病例可能损伤的病人中。因为二甲双胍肾功能损伤增加了二甲双胍蓄积的风险。临床建议基于患者的

估算的肾小球滤过率 (eGFR)。
in/1.73m²的患者应禁止服用，
/1.73m²减量。

者应至少每年检测eGFR, 可能有者(如老年人), 应当更频繁的

特定药物可能会增加二甲双胍蓄积，如损伤肾功能、导致明显血流动力学平衡、增加二甲双胍蓄积的药物。

年龄与二甲双胍相关的乳酸酸中毒
5年患者比年轻患者更可能有肝、
E患者应密切评估肾功能。

查一二甲双胍治疗的患者静脉注
急性肾功能改变, 发生乳酸酸中
ml/min/1.73m²之间的患者应在
或之前应停止服用本品, 有肝损
衰竭病史的患者给予动脉灌注本
品。造影结束48小时后重新评估
可以重新开始用药。

其他操作过程对食物和液体的限制减少、低血压和肾功能损伤的风险

险。当组织缺铁发生在足和血肌梗塞、酸中毒和情况时或过量饮酒作用。长期的肝功能相关的导致血中室诊断的维生素B₁₂在一项7%既往B₁₂水平维生素B₁₂素B₁₂-P情况的素B₁₂后血液学指数)查并给在速释素B₁₂不足)这类患者可能会有低血糖;单独接受但当进其他降糖酒等情患者,以更易发生患者的作对单独接受糖,因此但与胰岛素类药物)

【孕妇及孕妇】对于计划胎,但可接近正常哺乳期二甲双胍推荐哺乳

【儿童用】儿童(1岁)暂不推荐

【老年患者】由于老年患者可能出现肾功能减退,应定期检查